



Нейротоп ФЛ

Ефективний нейропротектор на основі субстанції оригінального препарату^{1,2,3}



ПОКАЗАННЯ¹

- гострі порушення мозкового кровообігу;
- дисциркуляторна енцефалопатія;
- нейроциркуляторна дистонія;
- черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм;
- легкі когнітивні розлади атеросклеротичного генезу;
- гострий інфаркт міокарда (з першої доби) – в складі комплексної терапії;
- тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах;
- абстинентний синдром при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і вегетативно-судинних розладів;
- гостра інтоксикація антипсихотичними засобами;
- гострі гнійно-запальні процеси черевної порожнини (гострий некролітичний панкреатит, перитоніт) – у складі комплексної терапії;
- первинна відкритокутова глаукома (на всіх стадіях) – у складі комплексної терапії.



СКОРОЧЕНА ІНСТРУКЦІЯ З МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ НЕЙРОТОП ФЛ (ETHYLMETHYLHYDROXYPYRIDINE SUCCINATE), Лікарська форма. Розчин для ін'єкцій. Склад: 1 мл розчину містить етилметилгідроксипіридину сукцинату 50 мг. Показання: гострі порушення мозкового кровообігу; дисциркуляторна енцефалопатія; нейроциркуляторна дистонія; черепно-мозкова травма, наслідки черепно-мозкових травм; легкі когнітивні розлади атеросклеротичного генезу; гострий інфаркт міокарда (з першої доби) – в складі комплексної терапії; тривожні розлади при невротичних і неврозоподібних станах; абстинентний синдром при алкоголізмі з переважанням неврозоподібних і вегетативно-судинних розладів; гостра інтоксикація антипсихотичними засобами; гострі гнійно-запальні процеси черевної порожнини (гострий некролітичний панкреатит, перитоніт) – у складі комплексної терапії. Спосіб застосування та дози. Внутрішньом'язово або внутрішньовенно (струменево або крапельно). Дози підбирають індивідуально. При інфузійному способі введення препарат розводять у фізіологічному розчині натрію хлориду. Струменево препарат вводять повільно протягом 5-7 хв, крапельно – зі швидкістю 40-60 крапель на хвилину. Починають лікування дорослих з дози 50-100 мг 1-3 рази на добу, поступово підвищуючи дозу до отримання терапевтичного ефекту. Максимальна добова доза не повинна перевищувати 800 мг. Особливості застосування при різних клінічних ситуаціях дивиться розділ «Спосіб застосування та дози та особливості застосування» повній інструкції для медичного застосування. Протипоказання: підвищена індивідуальна чутливість до препарату; гострі порушення функції печінки і нирок; дитячий вік; вагітність; період годування груддю. Побічні реакції. Рідко – нудота, сухість слизової оболонки рота, сонливість, алергічні реакції, порушення процесу засинання, відчуття тривоги, емоційна реактивність, дистальний гіпергідроз, головні болі, порушення координації, підвищення артеріального тиску, зниження артеріального тиску. Категорія відпуску. За рецептом. Реєстраційні посвідчення: UA/16933/01/01. Термін дії посвідчення: з 12.09.2018 по 12.09.2023, Наказ МОЗ: № 1664 від 12.09.2018.

1. Інструкція Нейротоп ФЛ РП UA/16933/01/01. 2. Саліна Е.А. Значення когнітивних розладів в топічній діагностиці при хронічній ішемії головного мозку та способи їх корекції. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук. 3. <https://fr.importgenius.com/russia/buyers/%D0%B7%D0%B0%D0%BE-%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80>. 4. Воронина Т. А. Антиоксидант мексидол. Основные нейропсихотропные эффекты и механизм действия // Психофармакол. Биол.Наркол. 2001. Т. 1. № 1. С. 2-12. 5. Інструкція Мексидол № Р N002161/01. 6. Ковалев В.П., Забозлаев А. А. Фармацевтическая композиция для парентерального введения 2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина сукцината и способ получения этой композиции. 25.08.2017 №217.015.В12F. 7. Інструкція UA/11143/01/01. 8. Інструкція UA/9896/01/01. 9. Сертифікат відповідності умов виробництва лікарських засобів вимогам належної виробничої практики №096/2019/GMP.

Детальна інформація про характеристики, лікувальні властивості і можливі побічні ефекти лікарського препарату Нейротоп ФЛ міститься в повній інструкції для медичного застосування РП UA/15442/01/01. Цей носій інформації призначено тільки фахівцям охорони здоров'я, для професійної діяльності медичних і фармацевтичних працівників. Якщо у вас є питання по препаратах компанії «УАБ «ФАРМЛІГА», ви можете звернутися до нас за адресою: «УАБ «ФАРМЛІГА», 07300, Київська обл., м. Вишгород, вул. Шолуденка, 1. email: info@farmlyga.it.

